



ULCERA GENITAL GANGRENOSA; A PROPÓSITO DE UN CASO

Erick Álvarez Pereira. 1; José Fernando Sequeda Monterosa. 2
 Diana Abuabara. Martín Parra, Daniel Uribe, Jazmin Chanaga. 3
 1. Médico Dermatólogo Docente Universidad de Cartagena
 2. Médico Pediatra Docente Universidad de Cartagena
 3. Estudiantes de medicina, Universidad de Cartagena

Introducción

La úlcera vulvar de Lipschutz es una rara entidad descubierta por el dermatólogo austriaco Benjamín Lipschutz, quien en 1913 describió una enfermedad aguda caracterizada por la aparición de úlceras genitales dolorosas en región vulvar, asociada a sintomatología sistémica general en mujeres jóvenes. Que no han iniciado vida sexual y que el estudio microbiológico de la lesión descarta un posible origen infeccioso. Es una entidad poco conocida e infrecuente por lo que es subdiagnosticada.

Resultados

Paciente femenina de 10 años de edad, asiste por cuadro clínico de 10 días caracterizado por febrícula, tragadina, mialgias. Hace 2 días aparecen pápulas a nivel de vulva que se ulceran ocasionando dolor que limita la marcha, niega vida sexual activa. Al examen físico se encuentra una adolescente eutrófica que a nivel de área genital presenta en labios menores 2 úlceras en espejo de no más de 1 cm (figura 1) cada una, bordes definidos, fondo necrótico. En labio mayor izquierdo se observa úlcera ovalada de 2x1 cms (figura 2) de bordes definidos, fondo necrótico, Him en anular sano. Se hace impresión diagnóstica de úlcera en vulva dolorosa, con lo que se interconsulta posible úlcera de Lipschutz, se inicia cubrimiento antibiótico de amplio espectro, baños coloidales, se solicitan paraclínicos que orienten posible germen causal: vdrl, serología para citomegalovirus, herpes simple, serología de Epstein barr; Dos semanas después asiste a control, refiere en mejoría del cuadro clínico con cicatrización de lesiones (figura 3), traen resultados de paraclínicos solicitados: negativos.

Conclusiones

El diagnóstico de úlcera genital de Lipschutz es clínico y por exclusión, basado en la historia detallada y un examen físico completo; tiene la presentación clínica miliar y gangrenosa, la resolución completa del cuadro se produce en un plazo aproximado de un mes, los criterios propuestos para el diagnóstico son edad menor de 20 años, presencia de una o múltiples úlceras vulvares, patrón bilateral, ausencia de contacto sexual, ausencia de inmunodeficiencia y exclusión de otras causas conocidas de ulceración genital. El conocimiento de este tipo de úlceras es importante, por la necesidad de diagnóstico diferencial con las úlceras infecciosas de origen venéreo, con las que es fácil confundirlas. El tratamiento de la úlcera genital aguda es principalmente de soporte e incluye el cuidado de las heridas y el alivio del dolor, aunque la administración de antibióticos de amplio espectro se ha demostrado eficaz en las formas gangrenosas.

Materiales y métodos

Presentación de caso clínico en el Hospital Napdeón Franco Pareja, de Cartagena, Bolívar. Confrontando con artículos de revisión y otros reportes de caso, en búsqueda electrónica de las siguientes bases de datos: PUBMED, Med-Line, Cochrane, Embase.

Figura 1. úlceras en espejo en labios menores, flujo vaginal mucosoide



Figura 2. Úlcera redondeada en labio mayor izquierdo



Figura 3. cicatrización de lesiones



Referencias

- Mohedas Tamayo AI, Ballesteros García MM, Penela Vélez de Guevara MT. Úlceras de Lipschutz: a propósito de dos nuevos casos. Acta Pediatr Esp. 2012;70:169-70.
- Muñoz Saá LE, Martínez Rodríguez AJ, Villanueva Asensio L. Úlcera de Lipschutz. Clin Invest Gin Obst. 2009;36:183-5.
- Eizaguirre FJ, Luces L, Anola E. Úlcera genital aguda no relacionada con enfermedad de transmisión sexual. An Pediatr (Barc). 2012;76:170-2.
- García Reymundo M, Montero Salas A, González Álvarez CM. Úlcera de Lipschutz: causa poco conocida de úlcera genital aguda. An Pediatr (Barc). 2010;72:443-4.
- Kam CS, Salomone BC, Dossi CMT. Úlcera genital aguda de Lipschutz: caso clínico. Rev Chil Obstet Ginecol. 2014;79:47-50.
- Rubio CP, Baquedano ML, Gil AE. Úlcera genital aguda en paciente adolescente. Rev Chil Obstet Ginecol. 2012;77:450-2.